

KRIZOVÝ SCÉNÁŘ SMĚREM K OBČANOVÍ OČKOVÁNÍ

K tomu, abychom mohli učinit správnou volbu, potřebujeme znát co možná nejvíce dostupných informací a mít možnost výběru, v plné zodpovědnosti za své zdraví.

Poprvé v historii se očkuje v celosvětovém měřítku proti nemoci, která má obrovskou **nadnárodní, politickou a mediální podporu**.

Od začátku je nám předkládáno, že se jedná o celosvětovou pandemii, nicméně i v nejvyšších číslech jsou počty **pozitivně testovaných** řádově nižší než limitní čísla **klinických případů** pro vyhlášení chřipkové epidemie. Navíc **doposud žádná hygienická stanice nevyhlásila probíhající epidemii**.

Vakcíny proti Covid byly ještě donedávna minimálně do roku 10/2022 v klinické studii a jsou proto **určeny pro emergentní použití**. K předpokládanému výsledku nemusí vůbec dojít. Nejsou a nemohou být známy případné dlouhodobé, negativní účinky. A navíc za ně ani výrobci, ani stát nenesou odpovědnost. MRNA vakcíny proti Covidu nejsou zárukou ochrany proti onemocnění a netlumí přenos infekce. Zabrání pouze těžkým příznakům nemoci.

Mimo jiné je nutné dodat, že po více než roce již byla vytvořena kolektivní imunita přirozeným proděláním infekce, tzv. promořením. A vždy platilo a platit bude, že **prodělání nemoci nám zajistí lepší a delší ochranu než vakcinace**. Imunitní reakce působí přesně lokálně a i bezpříznakové onemocnění vyvolá imunitní odpověď. Kaskádu imunitní odpovědi lze přirovnat k autu jedoucímu po hlavní cestě, které se v jednotlivých zatáčkách setkává s virem a tak se tvoří odpověď, na jejímž základě se tvoří slizniční protilátky (IgA). Opačnou cestu po vedlejší komunikaci volí vakcinace, která nastavuje IgG protilátky.

Po prodělání nemoci nelze studovat pouze pokles IgA a IgG, ale celou buněčnou imunitu T a B buněk, která přetrvává i po poklesu IgG a IgA. Takže **neplatí, že při poklesu IgG a IgA již člověk nemá imunitu**, jak je mylně opět médií a některými vakcinology předkládáno.

Domníváme se, že **očkování by mělo být na dobrovolné bázi** a měl by si ho hradit občan sám, nikoliv úhradou z veřejného zdravotnictví. Preferujeme neočkovat mladé, zdravé občany a děti. Považujeme za důležité, aby jednotlivec své rozhodnutí mohl konzultovat s odbornými lékaři, které pacient navštěvuje, které jsou však plně informovaní o očkování proti Covidu.

Očkování by mělo být **dobrovolné i pro starší občany, osoby rizikové** (komorbidity zejména hypertenze, DM, nadváha), stejně jako **pro občany, kteří podleli strachu**, jež na nás dnes a denně už přes rok prskají hlavní zprávy mainstreamových médií. Domníváme se, že takto uměle vyvolávaný **strach může být dokonce zhoubnější**, než celá infekce dohromady.

Ať už se pro vakcinaci rozhodneme či nikoliv, v každém případě bychom měli podpořit a kontinuálně pečovat o svůj imunitní systém (viz dokument PREVENCE).

Důležité upozornění!

V další části uvádíme několik možných způsobů konkrétní léčby. Než však budete číst dále, vezměte prosíme v potaz, že **žádné z těchto doporučení nenahrazuje osobní návštěvu, ani konzultaci s ošetřujícím lékařem, kterému důvěřujete! Čtete vždy pozorně příbalové informace a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.**

Autor dokumentu:

Zdravotní Výbor CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI, členové tohoto Zdravotního Výboru jsou lékaři a jiní zdravotní odborníci.

PŘED OČKOVÁNÍM

Jeden až dva týdny před očkováním je vhodné užívat:

- medikace, bylinky, dietní a režimová opatření (viz dokument PREVENCE);
- homeopatické léky **Thuya occidentalis 9CH** v dávce 1x denně 5 granulí. Začít den před očkováním a pokračovat až 7 dní po očkování [1], **Silicea 30CH** 1x týdně měsíc;
- **vitamin C** - dávkování dle věku;
- **vitamin D3** - doporučené dávkování dle věku;
- Tkánová **Schusslerova sůl č. 3**;
- pokud měl pacient v minulosti **problémy se srážením krve**, je **nutná konzultace s praktickým lékařem**, zda není očkování kontraindikováno;
- eliminace stresu;
- kvalitní spánek.



[1] <https://svethomeopatie.cz/cs/3582-ockovani-proti-onemocneni-covid-19>

PO OČKOVÁNÍ

Vitamin C liposomální - dávka 500 mg ihned po naočkování a poté 1 g/den.

Vitamin D3 - 400-2000UI.

Tkáňová Schusslerova sůl č. 4 - dávkování dle věku a doporučení terapeuta.

Engystol - 3x 1 1 tbl. 7 dní.

Zinek - 30 - 60 mg dle věku a konstituce.

Vhodná kombinace D3+Zinek + NAC.

Koupele v epsomské soli - 4 šálky soli, po dobu 20 - 30 minut.

24 h po očkování **nesportovat** a **vyvarovat se alkoholu**.

Zvýšit **příjem tekutin**.

V případě **otoku v místě vpichu Apis Mellifica 15CH**, **Glutathion** či jakákoliv silná antioxidanta typu bioflavonoidů, možno také použít **Glutathionové náplasti** na místo vpichu, nebo mírnit pomocí chladivých obkladů.

Při **únavě** a **bolesti hlavy Gelsemium sempervirens 15CH**. Homeopatika užívat 2-3x denně 5 granulí až do ústupu potíží.

Nežádoucí účinky hlásit praktickému lékaři nebo na stránkách SÚKLu.

V případě **nežádoucích účinků vakcinace** nebo i v rámci **detoxikace** organismu užívat po očkování nalačno každé ráno **N-Acetylcystein** 1 kapsle ráno a **Zinek** 1 tbl., dále během dne doplnit **Quercetinem**, **Vitamínem D3**.

Také je doporučován křen, odvar z Pampelišky smetánky, Ostropestřec mariánský.